

(https://secserv.adtech.de/?adlink/1608.1/6611277/0/16/AdId=-3;BnId=0;guid=1A75f43014-a111-11e8-a405-2c44fd953480;itime=395738766;gdpr=1;)

Unkräuter

## Wann keimen die Ersten Unkräuter im Raps?

von N.U. Agrar GmbH (/news/authors/?id=39)

Mittwoch, 15. August 2018

**Der gebeizte Raps benötigt zum Auflaufen eine Temperatursumme von 90 °C-Tagen. Ohne Beizung beginnt er bereits nach 70 °C aufzulaufen. Damit ist der Raps wie fast alle Kreuzblütler ein ausgesprochener Frühkeimer.**

Früher als der Raps laufen Kamille-Arten (*Anthemis* spp., *Matricaria* spp., *Tripleospermum* spp.) aus den obersten Millimetern des Bodens, auch die Vogelmiere (*Stellaria media*), die ebenfalls in der obersten Bodenschicht keimt. Schneller als der gebeizte Raps keimt auch das Hirtentäschelkraut (*Capsella bursa pastoris*).

Zusammen mit dem Raps laufen Stiefmütterchen (*Viola arvensis*), die meisten Rauken-Arten (*Sisymbrium* spp.) und das Hellerkraut (*Thlaspi arvense*) auf. Das Klettenlabkraut (*Galium aparine*) keimt dagegen 120 - 140 °C-Tage nach der Aussaat des Rapses, zeitgleich mit dem Klettenlabkraut kommt auch die Taubnessel (*Lamium* spp.).

THEMEN:

- Raps (/suche/schlagworte/Raps)    ■ Temperatursumme (/suche/schlagworte/Temperatursumme)
- Beizung (/suche/schlagworte/Beizung)    ■ Frühkeimer (/suche/schlagworte/Fr%C3%BChkeimer)
- Kreuzblütler (/suche/schlagworte/Kreuzbl%C3%B Ctler)    ■ Unkraut (/suche/schlagworte/Unkraut)
- Auflaufen (/suche/schlagworte/Auflaufen)

### Kommentare

Ihre E-Mail wird weder veröffentlicht noch weitergegeben. Notwendige Felder haben einen \*

Ihr Kommentar \*

Spielregeln (/service/spielregeln/)

Kommentar absenden